	Dan-mark	Sverige														Norge									Finland							R. Kar.	R. Lpm.
bifoveolatus Beck (scaber L., Thoms.)	1	2	3	1	B	3	4	V	6	7	8	9	M	J	V	a	-	c	d	-	f	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	S	-
angustisetulus V. Hansen	1	2	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aristatus Gyll.	1	2	-	S	H	3	4	D	U	V	8	H	M	J	-	a	-	c	-	-	-	-	-	-	1	2	I	-	-	-	-	-	-
Omias Schönh.																																	
mollinus Boh.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	-	c	-	e	f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phyllobius Schönh.																																	
viridicollis F.	1	2	3	1	B	3	4	5	6	7	8	G	-	-	L	a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	K	-	-	-	-
parvulus Ol. (virideaeris auct.)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
virideaeris Laich. (pomonae Ol.)	1	2	3	1	2	3	4	V	6	7	8	G	-	-	-	a	-	c	-	e	f	-	-	-	-	Finland							
oblongus L.	1	2	3	1	H	3	Ö	V	6	-	-	-	-	-	-	a	b	-	-	-	-	-	-	-	-	N	E	-	-	-	-	S	-
piri L.	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	G	-	-	-	a	b	c	-	e	?	-	-	-	-	T	3	-	5	-	-	1	-
maculicornis Germ.	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	H	M	L	-	a	b	c	-	-	-	-	-	-	1	N	3	T	5	-	-	1	-
argentatus L.	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	G	-	-	-	a	b	c	d	-	-	-	-	-	1	2	3	-	S	-	-	-	-
betulae F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
arborator Hbst (psittacinus Germ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
calcaratus F. (glaucus auct.)	1	2	-	1	H	S	-	V	R	-	V	-	-	-	-	a	-	-	-	-	f	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-
urticae De G.	1	2	-	1	2	3	-	V	G	-	-	-	-	-	-	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	3	-	S	-	-	1	-
maculatus Tourn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Polydrosus Germ.																																	
marginatus Steph.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
atomarius Ol.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pterygomalis Boh.	1	2	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
flavipes De G.	1	2	-	S	B	Ö	4	V	6	N	8	G	-	-	-	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
cervinus L.	1	2	-	1	2	3	4	5	6	7	8	H	M	J	L	a	b	c	d	e	-	-	-	-	1	A	-	-	-	-	-	-	-
pilosus Gredl.	-	-	-	1	H	3	Ö	5	6	N	8	H	M	J	L	a	-	c	d	e	f	g	-	-	1	2	3	4	5	6	-	1	-
confluens Steph.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
undatus F.	1	2	-	1	2	3	?	V	6	7	8	9	10	11	12	a	b	c	d	e	f	g	h	-	-	2	3	4	5	6	P	S	-
ruficornis Bonsd.	-	-	-	S	B	3	Ö	V	6	7	8	9	10	11	L	a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3	4	5	6	7	1	2
sericeus Schall.	-	2	-	S	?	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mollis Ström	1	2	-	1	2	3	4	V	6	7	8	H	10	-	-	a	b	c	d	-	f	-	-	-	1	2	3	-	5	-	-	1	-
Liophloeus Germ.																																	
tessulatus Müll.	1	2	3	S	H	3	4	V	6	7	-	?	-	-	-	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finland							
Sciaphobus Dan.																																	
rubi Gyll.	-	-	-	?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sciaphilus Steph.																																	
asperatus Bonsd.	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Å	-	-	a	b	c	-	-	f	-	-	-	1	2	3	T	K	-	-	S	-
Brachysomus Steph.																																	
echinatus Bonsd.	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J	L	a	-	c	-	e	f	-	-	-	1	2	3	4	5	6	-	1	-
Foucartia Duv.																																	
squamulata Hbst	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barypithes Duv.																																	
araneiformis Schrk	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Chevrolati Boh.	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pellucidus Boh.	1	2	-	S	-	Ö	4	V	U	N	D	-	-	H	-	a	b	-	-	-	-	-	-	-	-	W	I	-	-	-	-	-	-
trichopterus Gaut.	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mollicomus Ahr.	1	2	-	1	-	-	4	V	S	-	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f	-	-	-	-	W	I	-	-	-	-	-	-
Brachyderes Schönh.																																	
incanus L.	1	2	-	1	2	3	4	V	6	7	8	H	M	H	V	a	b	c	d	-	-	-	-	-	1	2	3	4	S	A	-	-	-
Strophosomus Steph.																																	
fulvicornis Walt.	1	2	3	1	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	-	-	-	-	-	-	-
melanogrammus Först. (obesus Thoms.)	1	2	3	1	2	3	4	5	6	-	-	-	-	-	-	a	b	c	d	e	f	g	-	-	1	A	-	-	-	-	-	-	-

bifoveolatus – Hl (Tjeder), Ög (S. O. Larsson), Vb (L. G), Ångm (S. Andersson), Hl o Ångm (Dan Cat.), Ångm (Bruce), Jmtl (Lbl i Rdl), Hl (Ankarcrona)

angustisetulus – Vid Dalm, E.T. 1944 p. 9 o 1940 p. 9

aristatus – Ångm (Bruce E.T. 1944), Dlsl (A. J), Hl o Mpd (Sjö), Mpd (Dan Cat.), Upl (Bruce), Ol (coll. Sjö). Sk (Ent. N. i. g. 1960 p. 16 med utredning)

Trachyphloeus n. sp. – Danmark (West Ent. Medd. XXI p. 645) = T. heymesi Hubenth. V. Hansen. Biller XX p. 27

mollinus – [Smål, ej Halmst, som concinnus; Annio So. Ins. f.]

viridicollis – Bol (Tjeder), Lyl. Lpm (Brinck o Hagvist E.T. 1947 p. 187), Boh (Rytterfelt), Gstr (Sjö), Boh (S. A. Larsson), Boh (Kuft.)

parvulus – [Sk: Annio So. Ins. f.]

viridiceris – Gstr (Lbl i Rdl)

oblongus – Boh (Rytterfelt, Bucht D, S. A. Larsson)

piri – Hls (Lbl), Ög (Högl.), Mpd (Bc i Rdl)

maculicornis – Gstr (Palm), Ångm (Bruce ET 1944), Hjd (Lbl), Jmtl (Dan Cat.), Ång (Skoog), Ång (Hollmer), Jmtl (Högl.)

argentatus – Hls (Sjö), Ög (Högl.), Ög (Annio So. Ins. f.)

betulae –

arboretus –

Calcaratus – Upl (Palm ET 1942), Hl (Ankarcrona)

urticae – Dlsl o Sdml (Lbl i Rdl), [Upl: Annio So. Ins. f.]
atomarius – se V. H. Biller XX p. 20
pterygomalis – se Nyholm Op. E. 1945:156; Sk (Op. E. 1956:246) [Sk: Annio So. Ins. f.], Sk (Ent. N. i. g. 1958:7)

flavipes – Bl (Brinck o Heg. E.T. 1947:187)

cervinus – Hls (Högl), Lul (Högl), Lpp (Zett), Ög (Annio So. Ins. f.), Ångm (Hollmer, d. kej)

pilosus – Boh (Rytterf.), Öl o Vstml (A. Müller), Med o Jmtl (Lbl), Ång (Bruce ET 1944), Vb (Ång), Vb o Lul (M. L)

confluens –

undatus – Lu Lpm (W. 1945), Nb (L. G), Ly Lpm (Fridén & B. Persson), Vb (M. L), Nb i Pajala (2), Tol (Högl.), [Gtl: Annio So. Ins. f.], Vb (Wirén)

ruficornis – Tol (Kvikkjokk), Lyl (Fridén, B. Persson), Vb, Nb, Ns, Ps, Lu, Tol (M. L), alla Lpm (Brundin, Mörberg), Pil (Lits Pjela), Vb (Linnman) [Gtl: Annio So. Ins. f.], Tol (Peter)

stricus –

mollis – Dlsl (Svensson E.T 1944), Vrml (Nilsson E.T 1954:64), Dr (Åberg), Hls (Kef), Hel (Högl.)

tessulatus – [Hls: Annio So. Ins. f.]

rubi – ej i Sv (Palm 1955)

asperatus – Vrml (W. 1942)

echinatus – Ly Lpm (B. Persson, Kult. kej), Vl (coll. Sjö), Vb (B. Fridén i Rdl), Hjd (Lbl i Rdl)

squamulata – Gtl ej Jhn o. Gtl. Fårön leg. A. J. i Rdl.

araneiformis –

Chevrolati – Bl o Boh (A. J); Troligen infört med trädgårdsväxter, 1 ex funnit i Malmö (Palm)

pellucidus – {Boh (Högl.)} Bol (Tjeder), Ög (Rytterfelt), Sdml (N. A. Pehrsson), Ög (Malmström), Hl (Sjö), Boh (Högl.), Vstml (Dan Cat), Smål (Bruce), Ög (Ahlgr.), Vrml (coll. Sjö)

trichopterus – Boh (Tjeder E.T. 1948 p. 218), Ög (Dan Cat.), Öl (A. Müller)

mollicomus – Upl Nr (A. J) [Smål. Kalmar: Annio So. Ins. f.]

incanus – Dlsl (Svensson E.T. 1944), Ångml (Ohlander), Vb (Lindroth), Gstr (coll. Fridén)

fulvicornis –

melanogrammus –